Um den größtmöglichen Nutzen aus der Therapie mit OZURDEX® für Ihre Gesundheit zu erzielen, um die richtige Anwendung zu gewährleisten und die Nebenwirkungen zu begrenzen, werden in diesem Informationsmaterial bestimmte Vorsichtsmaßnahmen erläutert (RMA Version 02/2019).

OZURDEX 700 Mikrogramm intravitreales Implantat in einem Applikator (Dexamethason)

PATIENTENBROSCHÜRE (MIT BEIGEFÜGTER AUDIO-CD)

Eine Information für Patienten über die Behandlung mit OZURDEX®

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie OZURDEX® verwenden. Der vollständige, aktualisierte Text der Packungsbeilage kann über die Internetadresse www.afmps.be unter der Rubrik „Notices et RCP des médicaments“ abgerufen werden.

Wie bereiten Sie sich auf Ihre Behandlung vor?

Vor der Behandlung wird Ihr Arzt Ihnen Augentropfen mit Antibiotika verschreiben. Diese müssen Sie vor der Behandlung 3 Tage lang anwenden. Außerdem müssen Sie diese Augentropfen nach der Behandlung noch 3 Tage lang weiter anwenden.

Worin besteht die Behandlung?

Als Vorbereitung auf die Behandlung wird der Arzt:

- Ihr Auge spülen, um Infektionen vorzubeugen, und ggf. auch antibiotische Augentropfen einbringen
- Ihr Gesicht mit einem speziellen Tuch abdecken
- Ihr Auge mit einem Betäubungsmittel betäuben, damit Sie keine Schmerzen haben
- ein Hilfsmittel anwenden, damit Ihr Auge vorsichtig offengehalten wird

Der Arzt wird dann mit einem speziell dafür entworfenen Applikator das Arzneimittel ins Auge (ins Augenweiß) injizieren. Möglicherweise hören Sie während der Behandlung ein klickendes Geräusch und spüren einen leichten Druck auf dem Auge.

Ihr Arzt wird dann Routineaugenuntersuchungen durchführen, um nachzuprüfen, ob das Arzneimittel erfolgreich verabreicht wurde.

Was geschieht nach der Behandlung?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. In der Gebrauchsinformation von OZURDEX® finden Sie eine detaillierte Auflistung möglicher Nebenwirkungen. Bitten Sie Ihren Arzt oder das medizinische Fachpersonal um die Gebrauchsinformation.

Nach der Injektion kann Ihre Sicht etwa einen Tag lang verschwommen sein. Möglicherweise sehen Sie auch Punkte oder Flecken. Dies ist normal und sollte allmählich von selbst nachlassen. Wenn die Symptome nicht verschwinden oder sich verschlimmern, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Wenn Sie ein Fahrzeug führen oder Maschinen bedienen, dürfen Sie dies erst wieder tun, sobald Sie nicht mehr verschwommen sehen.

Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt, wenn Sie zu irgend-einem Zeitpunkt eines der folgenden Symptome bekommen:

<table>
<tr><td> </td><td>

- Verschlechterung der Sicht nach der Injektion
- mehr als 1 Tag lang nach der Injektion an verschwommenem Sehen leiden
- Schmerzen oder unangenehmes Empfinden im Auge oder um das Auge herum
- zunehmende Rötung im Auge
- Punkte- und Flecken-Sehen nimmt zu
- Nässen des Auges

</td></tr>
<tr><td colspan="2">Notieren Sie die Notrufnummer Ihres Arztes, den Sie anrufen müssen, wenn Sie schwere Nebenwirkungen oder Reaktionen bekommen:

Telefonnummer Ihres Augenarztes:
……..
oder
Telefonnummer des Krankenhauses (Notaufnahme):
……..</td></tr>
</table>

Allergan NV/SA
De Kleetlaan 4
1831 Diegem