RMA versie 03/2022

PENTHROX® (Methoxyfluraan) Controlesteekkaart

Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie: Lees aandachtig de SKP vooraleer PENTHROX® voor te schrijven. De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP is beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”

TE CONTROLEREN VOORAFGAANDELIJK AAN DE TOEDIENING

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR RISICOBEPERKING VOOR GEZONDHEIDSZORGBEOEFENAARS

Deze lijst is van essentieel belang om het juiste gebruik van methoxyfluraan en de passende risicobeheersmaatregelen te garanderen.
Voorafgaandelijk aan het gebruik van methoxyfluraan gaarne ... **TE CONTROLEREN!:**

Dien methoxyfluraan NIET toe als de patiënt één van deze risico's vertoont of één van de geneesmiddelen neemt die aan de ommezijde van deze kaart vermeld staan

1. Lever (voorgeschiedenis van levertoxiciteit met methoxyfluraan of gehalogeneerde koolwaterstofanesthesica)
2. Beademing (Klinisch manifeste respiratoire depressie)
3. Toestand van veranderd bewustzijn (waaronder als gevolg van hoofdtrauma, medicijnen, alcohol)
4. Nieren (klinisch aanzienlijke aantasting van de nierfunctie)
5. Interacties met andere geneesmiddelen (zie ommezijde)
6. Leeftijd jonger dan 18 jaar
7. Klinisch manifeste cardiovasculaire instabiliteit
8. Verhoogde lichaamstemperatuur (maligne hyperthermie of bekende genetische predispositie)
9. Bekende overgevoeligheidsreactie voor methoxyfluraan of één van de hulpstoffen
!. Toediening: niet meer dan 2 flesjes per toediening en 5 flesjes per week

NIET GEBRUIKEN IN COMBINATIE MET:

- Enzyminductoren van CYP 450 (bijvoorbeeld: alcohol, isoniazide, rifampicine of fenobarbital).
- Geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze een nefrotoxisch effect hebben (bijvoorbeeld: contrastmiddelen of bepaalde antibiotica zoals tetracycline, gentamicine, colistine, polymyxine B of amfotericine B).
- Sevofluraananesthesie (verhoogde concentraties van fluoride-ionen in het serum vanwege de nefrotoxiciteit van methoxyfluraan).

Gelijktijdig gebruik van methoxyfluraan met onderdrukkers van het centrale zenuwstelsel (CZS) kan de onderdrukkende effecten verhogen. Deze patiënten moeten nauwlettend worden opgevolgd.

Leg aan de patiënt de instructies uit voor een juiste toediening van PENTHROX®.
HERINNERING:

- Zorg ervoor om de laagste effectieve dosis toe te dienen en dat de maximale dosis van 6 ml (of 2 flesjes per toediening) niet wordt overschre

Materiaal bestellen: U kunt steeds extra exemplaren van de informatiebrochure voor gezondheidszorgbeoefenaars, controlesteekkaarten en waarschuwingskaarten voor patiënten bestellen door te mailen naar SafetyMDI.Belgium@pharmalex.com of te bellen naar het nummer +32 800 72 208.

BE-PA-HC-V2