

Cette carte patient contient des informations de sécurité importantes dont vous devez prendre connaissance avant et durant le traitement par injections d'acide zolédronique (Zoledronic acid Mylan) pour les problèmes liés au cancer.

ZOLEDRONIC ACID MYLAN (ACIDE ZOLÉDRONIQUE): CARTE DE RAPPEL POUR LES PATIENTS

Votre médecin a recommandé que vous soyez traité par injections d'acide zolédronique (Zoledronic acid Mylan) pour aider à

- prévenir les complications osseuses (ex : les fractures) causées par les métastases osseuses, ou le cancer des os
- diminuer le taux de calcium dans le sang des patients adultes lorsque celui-ci est élevé en raison de la présence d'une tumeur.

Un effet indésirable appelé ostéonécrose de la mâchoire (dommages osseux dans la mâchoire) a été rapporté (jusqu'à 1 personne sur 100) chez les patients recevant des injections d'acide zolédronique (Zoledronic acid Mylan) pour les problèmes liés au cancer. Une ostéonécrose de la mâchoire peut également survenir après arrêt du traitement. Afin de réduire le risque de développer une ostéonécrose de la mâchoire, vous devez prendre certaines précautions :

Avant de commencer le traitement :

- Demandez à votre médecin de vous parler de l'ostéonécrose de la mâchoire avant de commencer le traitement.
- Vérifiez auprès de votre médecin si un examen dentaire est recommandé avant que vous commenciez le traitement par acide zolédronique (Zoledronic acid Mylan) et informez votre dentiste que vous commencez un traitement par acide zolédronique.
- Informez votre médecin/infirmière (professionnel de santé) si vous présentez des altérations au niveau de la bouche ou des dents.

Les patients qui se soumettent à une chirurgie dentaire (ex : extractions dentaires), qui ne suivent pas de soins dentaires réguliers ou qui ont une maladie des gencives, qui sont fumeurs, qui reçoivent différents types de traitements contre le cancer ou qui étaient précédemment traités par un biphosphonate (utilisé pour traiter ou prévenir les affections osseuses) peuvent avoir un risque plus élevé de développer une ostéonécrose de la mâchoire.

Pendant votre traitement :

- Vous devez maintenir une bonne hygiène buccale, vous assurer que votre dentier est correctement ajusté et suivre des examens dentaires réguliers.
- Si vous suivez des soins dentaires ou allez-vous soumettre à une chirurgie dentaire (ex : extractions dentaires), informez votre médecin et dites à votre dentiste que vous êtes traité par acide zolédronique (Zoledronic acid Mylan).
- Contactez votre médecin et votre dentiste immédiatement si vous présentez un problème avec votre bouche ou vos dents tel que : perte de dent, douleur, gonflement, non-cicatrisation des plaies ou écoulement, car ceux-ci peuvent être les signes d'une ostéonécrose de la mâchoire.

Lisez attentivement la notice avant d'utiliser le Zoledronic acid Mylan (acide zolédronique), disponible sur le site suivant : www.fagg-afmps.be