

Cette carte de rappel contient d'importantes informations de sécurité à connaître avant et pendant le traitement avec l'acide zolédronique (Aclasta).

ACLASTA® (ACIDE ZOLÉDRONIQUE) : LA CARTE PATIENT SUR LES OSTÉONÉCROSES DE LA MÂCHOIRE

Votre médecin a recommandé que l'on vous administre de l'acide zolédronique (Aclasta) ; ce médicament est utilisé pour le traitement des femmes ménopausées et des hommes adultes souffrant d'ostéoporose ou d'ostéoporose induite par les corticostéroïdes ainsi que pour le traitement de la maladie osseuse de Paget chez l'adulte. Ces maladies se caractérisent par un affaiblissement et une fragilisation des os, les rendant plus sensibles aux fractures.

Un effet indésirable, appelé ostéonécrose de la mâchoire (ONM) (lésions osseuses de la mâchoire), a été rapporté dans de très rares cas chez les patients traités avec de l'acide zolédronique pour une ostéoporose. L'ONM peut également se manifester après l'arrêt du traitement.

Il est important d'essayer d'éviter l'ONM car il s'agit d'une affection douloureuse pouvant être difficile à traiter. Afin de réduire le risque de survenue de cet effet indésirable, vous devez prendre quelques précautions.

Avant le début du traitement :

Avant de recevoir votre traitement par Aclasta, informez votre médecin, pharmacien ou infirmière si :

- vous présentez des problèmes au niveau de votre bouche ou de vos dents tels qu'une mauvaise santé dentaire, des maladies des gencives, ou qu'une extraction dentaire est prévue ;
- vous ne recevez pas de soins dentaires réguliers ou n'avez pas eu un bilan dentaire depuis longtemps ;
- vous êtes fumeur (car cela peut augmenter le risque de problèmes dentaires) ;
- vous avez déjà été traité avec un bisphosphonate (utilisé pour traiter ou prévenir des troubles osseux) ;
- vous prenez des médicaments appelés corticoïdes (tels que la prednisolone ou la dexaméthasone) ;
- vous avez un cancer.

Votre médecin peut vous demander de faire un examen dentaire avant de commencer le traitement par Aclasta.

Pendant votre traitement par Aclasta :

- Vous devez maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire (y compris un brossage régulier des dents) et suivre des examens dentaires réguliers. Si vous portez des prothèses dentaires vous devez vous assurer qu'elles s'adaptent correctement.
- Si vous êtes sous traitement dentaire ou allez subir une chirurgie dentaire (telle que des extractions dentaires), informez votre médecin de votre traitement dentaire et informez votre dentiste que vous êtes traité par Aclasta.
- Contactez immédiatement votre médecin et votre dentiste si vous rencontrez des problèmes au niveau de votre bouche ou de vos dents comme un déchaussement des dents, des douleurs ou un gonflement, ou une non-cicatrisation des plaies ou un écoulement, car ceux-ci pourraient être les signes d'une ostéonécrose de la mâchoire.

**Lisez attentivement la notice
avant d'utiliser le médicament Aclasta®**

BEXXXXXXXXXX - 00/00/2016