

Notfallrufnummern

Name des betreuenden Mediziners 	+32
---	-----------

Lesen Sie sich die Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie das Medikament Erivedge einnehmen.

Erivedge® (Vismodegib) Patientenkarte

RMA Version 03/2019

**Erivedge kann zu Missbildungen des
ungeborenen Kindes oder zu dessen Tod führen.**



Was müssen Patientinnen im gebärfähigen Alter beachten?

- Während Ihrer Behandlung und der 24 Monate, die auf die letzte Dosis folgen, müssen Sie stets zwei empfohlene Methoden der Empfängnisverhütung anwenden. Weitere Infos hierzu finden Sie in der Broschüre zur Patienteninformation.

- Sie müssen jeden Monat einen Schwangerschaftstest machen, um eine Schwangerschaft auszuschließen.

Was müssen männliche Patienten beachten?

- Während Ihrer Behandlung und für zwei weitere Monate nach der letzten Dosis müssen Sie beim Geschlechtsverkehr mit Frauen stets ein Kondom benutzen (möglichst mit Spermizid).

- Während Ihrer Behandlung und für zwei weitere Monate nach der letzten Dosis dürfen Sie kein Sperma für Samenspenden abgeben.

Wenn sich bei Ihnen bzw. Ihrer Partnerin die Regel verzögert, wenn eine Schwangerschaft nicht auszuschließen ist oder Sie schwanger sind, sprechen Sie bitte sofort mit Ihrem Arzt oder dem medizinischen Fachpersonal.

- Gilt nur für Patientinnen: Wenn Sie während der Einnahme von Erivedge und während der 24 Monate, die auf die letzte Dosis folgen, den Verdacht haben, dass Sie schwanger sein könnten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
- Gilt nur für männliche Patienten: Wenn Ihre Partnerin während Ihrer Behandlung mit Erivedge und für zwei weitere Monate nach der letzten Dosis vermutet, schwanger zu sein, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Gilt für alle Patienten:

- Geben Sie dieses Medikament nie einer anderen Person.
- Während Ihrer Behandlung und für 24 weitere Monate nach Ihrer letzten Dosis dürfen Sie kein Blut spenden.
- Geben Sie alle nicht verbrauchten Kapseln nach dem Ende Ihrer Behandlung wieder zurück.