

Telefoonnummers in noodgevallen

Naam van de gezondheidszorgbeoefenaar die de behandeling start	+32
---	-----------

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens Erivedge te gebruiken.

RMA versie 03/2019

Erivedge® (vismodegib) Herinneringskaart voor patiënten

Erivedge® kan schadelijk zijn of tot de dood van uw ongeboren baby leiden.



Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten:

- Altijd **2** aanbevolen anticonceptiemethoden gebruiken tijdens hun behandeling en gedurende 24 maanden na hun laatste dosis (voor meer informatie, raadpleeg de “Brochure voor patiënten”)

- Maandelijks een zwangerschapstest uitvoeren om na te gaan of ze al dan niet zwanger zijn.

Mannelijke patiënten moeten:

- Altijd een condoom gebruiken (met zaaddodend middel, indien beschikbaar) wanneer ze seks hebben met een vrouw, tijdens het verloop van hun behandeling en gedurende 2 maanden na hun laatste dosis.
- Zich onthouden van spermadonaties tijdens de behandeling en gedurende 2 maanden na hun laatste dosis.

Als u of uw partner een menstruatieperiode heeft gemist, een zwangerschap vermoedt of zwanger bent/is, raadpleeg onmiddellijk uw arts of gezondheidszorgbeoefenaar.

- Voor vrouwelijke patiënten: als u een zwangerschap vermoedt terwijl u Erivedge gebruikt en gedurende 24 maanden na uw laatste dosis, raadpleeg dan uw arts.
- Voor mannelijke patiënten: als uw partner zwanger denkt te zijn terwijl u Erivedge gebruikt en gedurende 2 maanden na uw laatste dosis, raadpleeg dan uw arts.

Voor alle patiënten:

- Geef dit geneesmiddel nooit aan iemand anders.
- Doneer geen bloed tijdens uw behandeling en gedurende 24 maanden na uw laatste dosis.
- Breng alle ongebruikte capsules aan het einde van de behandeling terug.