RMA version 11/2016

FARYDAK®
(panobinostat)

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire

COMMENT UTILISER VOTRE CARTE DE MÉDICAMENT POUR VOTRE TRAITEMENT PAR FARYDAK® ?

Votre médecin vous a prescrit FARYDAK® (panobinostat). Ce médicament est utilisé en association avec le bortézomib (injection) et la dexaméthasone par voie orale pour le traitement de personnes atteintes du myélome multiple, qui ont une rechute.

Utilisez votre carte de médicament pour surveiller au jour le jour votre utilisation du médicament

1. **Familiarisez-vous avec votre carte de médicament.**
   Sur votre carte, vous trouverez sur chaque ligne, quel médicament vous devez prendre ce jour.
   Au début de chaque cycle, vous recevrez une nouvelle carte.

2. **Discutez avec votre médecin du jour de début et de la posologie de FARYDAK®.**
   Pour vous aider à vous souvenir quand vous devez prendre vos médicaments, le/la soignant(e) notera pour vous le jour de début. Ensuite, remplissez vous-même votre carte avec le jour de la semaine ou la date dans la case adéquate. Remplissez toutes les cases pour les 3 semaines du cycle de traitement.
   Vu que FARYDAK® est disponible en 3 posologies différentes, votre médecin ou soignant(e) indiquera quelle posologie de FARYDAK® vous a été prescrite.

3. **Prenez votre médicament selon la prescription de votre médecin.**
   Après avoir pris chaque médicament, cochez chaque jour la petite case pour vous souvenir que vous avez pris le médicament. Prenez chaque dose telle qu'indiquée sur votre carte de médicament. Si vous oubliez une dose, ne cochez pas le petite case. Ne prenez PAS de dose double le jour suivant. Si par accident, vous AVEZ pris une dose double, notez le sur votre carte.

4. **Prenez votre carte de médicament à chaque visite.**
   Votre médecin consultera votre carte et si nécessaire, discutera avec vous de la manière dont vous prenez votre médicament. Il est important que vous suiviez les instructions de votre médecin.

NOVARTIS

CYCLES 1-8 (BORTÉZOMIB DEUX FOIS PAR SEMAINE)

Nom et prénom du/de la patient(e) : .....

Date de début : _____

Dose prescrite de FARYDAK® (panobinostat): ☐ 10 mg ☐ 15 mg ☐ 20 mg

Semaine 1			Semaine 2			Semaine 3 (Pause)		
Jour du cycle	Jour de la semaine ou date (jj/mm)	Cocher CHAQUE case respective	Jour du cycle	Jour de la semaine ou date (jj/mm)	Cocher CHAQUE case respective	Jour du cycle	Jour de la semaine ou date (jj/mm)	Cocher CHAQUE case respective
Jour 1		F + B + D ☐ ☐ ☐	Jour 8		F + B + D ☐ ☐ ☐	Jour 15		Pas de prise ☐
Jour 2		D ☐	Jour 9		D ☐	Jour 16		Pas de prise ☐
Jour 3		F ☐	Jour 10		F ☐	Jour 17		Pas de prise ☐
Jour 4		B + D ☐ ☐	Jour 11		B + D ☐ ☐	Jour 18		Pas de prise ☐
Jour 5		F + D ☐ ☐	Jour 12		F + D ☐ ☐	Jour 19		Pas de prise ☐
Jour 6		Pas de prise ☐	Jour 13		Pas de prise ☐	Jour 20		Pas de prise ☐
Jour 7		Pas de prise ☐	Jour 14		Pas de prise ☐	Jour 21		Pas de prise ☐

C'est le schéma d'administration préféré pour FARYDAK®. Suivez précisément les instructions de votre médecin.

F FARYDAK D Dexaméthasone B Bortézomib

Ne prenez PAS de médicament les jours de pause ou pendant la semaine de pause

Lisez attentivement la notice avant d'utiliser le FARYDAK® (panobinostat) et suivez les instructions de votre médecin pour prendre FARYDAK® avec le bortézomib et la dexaméthasone.

Éditeur responsable : Novartis Pharma SA - Medialaan 40 - 1800 Vilvoorde - BExxxxxxxxxx - xx/xx/2016