RMA versie 11/2016

FARYDAK®
(panobinostat)

▼ **Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring**

HOE GEBRUIKT U UW MEDICATIEKAART VOOR UW BEHANDELING MET FARYDAK®?

Uw arts heeft u FARYDAK® (panobinostat) voorgeschreven. Dit medicijn wordt gebruikt in combinatie met bortezomib (injectie) en via de mond ingenomen dexamethason voor de behandeling van mensen met multipel myeloom die een terugval hebben.

Gebruik uw medicatiekaart om uw medicijngebruik elke dag bij te houden

1. **Raak vertrouwd met uw medicatiekaart.**
Op uw medicatiekaart vindt u telkens op een nieuwe regel welke medicijnen u die dag moet nemen.
Aan het begin van iedere cyclus krijgt u een nieuwe medicatiekaart.

2. **Bespreek uw startdatum en dosissterkte van FARYDAK® met uw arts.**
Om u te helpen onthouden wanneer u uw medicijnen moet nemen, noteert uw zorgverlener de startdatum voor u. Vervolgens vult u de kaart verder zelf in met de dag van de week of de datum in de juiste vakjes. Vul alle vakjes in voor alle 3 weken van de behandelingscyclus.
Omdat FARYDAK® beschikbaar is in 3 verschillende dosissterkten, zal uw arts of verpleegkundige invullen wat uw voorgeschreven dosissterkte FARYDAK® is.

3. **Neem uw medicatie volgens het voorschrift van uw arts.**
Nadat u elk medicijn hebt genomen, vinkt u elke dag het vakje af zodat u onthoudt dat u het medicijn hebt genomen. Neem alle doses in zoals aangegeven staat op uw medicatiekaart. Als u een dosis vergeet, vink het vakje dan niet af. Neem de volgende dag GEEN dubbele dosis. Als u per ongeluk WEL een dubbele dosis hebt genomen, noteer dit dan op uw medicatiekaart.

4. **Neem uw medicatiekaart mee naar elk bezoek.**
Uw arts zal uw medicatiekaart bekijken en, als dat nodig is, met u bespreken hoe u uw medicatie neemt.
Het is belangrijk dat u de instructies van uw arts opvolgt.

NOVARTIS

CYCLI 9-16 (BORTEZOMIB EENMAAL PER WEEK)

Naam en voornaam patiënt : .....

Startdatum: _____

Voorgeschreven dosis FARYDAK® (panobinostat): ☐ 10 mg ☐ 15 mg ☐ 20 mg

Week 1		
Dag van de cyclus	Dag v.d. week of datum (dd/mm)	ELK betreffende vakje afvinken
Dag 1		F + B + D ☐ ☐ ☐
Dag 2		D ☐
Dag 3		F ☐
Dag 4		Geen dosis ☐
Dag 5		F ☐
Dag 6		Geen dosis ☐
Dag 7		Geen dosis ☐

Week 2		
Dag van de cyclus	Dag v.d. week of datum (dd/mm)	ELK betreffende vakje afvinken
Dag 8		F + B + D ☐ ☐ ☐
Dag 9		D ☐
Dag 10		F ☐
Dag 11		Geen dosis ☐
Dag 12		F ☐
Dag 13		Geen dosis ☐
Dag 14		Geen dosis ☐

Week 3 (Pauze)		
Dag van de cyclus	Dag v.d. week of datum (dd/mm)	ELK betreffende vakje afvinken
Dag 15		Geen dosis ☐
Dag 16		Geen dosis ☐
Dag 17		Geen dosis ☐
Dag 18		Geen dosis ☐
Dag 19		Geen dosis ☐
Dag 20		Geen dosis ☐
Dag 21		Geen dosis ☐

Dit is het goedgekeurde toedieningsschema voor FARYDAK®. Volg de instructies van uw arts nauwgezet op.

F FARYDAK D Dexamethason B Bortezomib

Neem GEEN medicatie in op uw pauzedagen of tijdens uw pauzeweek

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel FARYDAK® gebruikt en volg de instructies van uw arts op over hoe u FARYDAK® moet innemen samen met bortezomib en dexamethason.

Verantwoordelijke uitgever: Novartis Pharma NV - Medialaan 40 - 1800 Vilvoorde - BExxxxxxxxxx - xx/xx/2016