

Le neurologue qui me prescrit LEMTRADA® peut être contacté au numéro suivant. Les autres médecins ou professionnels de la santé engagés dans mes soins peuvent également être mentionnés.

Si des examens médicaux sont réalisés, veuillez fournir, au(x) médecin(s) énuméré(s) ci-dessous, des copies de tous les dossiers médicaux, y compris les résultats de tests et/ou traitements.

Nom du Patient: _____

Signature du Patient: _____

Nom	Numéro de téléphone
Neurologue	
Médecin généraliste	
Infirmière SEP	

RMA version modifiée 09/2018

LEMTRADA
12mg
olemtuzumab

Carte d'alerte pour le patient

Ayez toujours cette carte sur vous et montrez-la à toutes les personnes qui vous prodiguent des soins en urgence et aux professionnels de santé pour les informer que vous suivez un traitement par LEMTRADA®.

Un traitement par LEMTRADA® peut augmenter le risque d' :

Affections auto-immunes telles que :

< Un problème de saignement appelé Purpura

Thrombocytopenique d'origine

Immunitaire (PTI)

< Des problèmes de la glande thyroïde (hypo/hyperthyroïdie)

Infections graves

< Des affections rénales rares telles que la maladie des anticorps anti-membrane basale glomérulaire (anti-MBG)

SANOFI GENZYME

Médecins: Consultez le résumé des caractéristiques du produit (RCP) pour plus d'information.

Effets indésirables importants à surveiller

Appelez immédiatement votre neurologue pour lui signaler les symptômes suivants, qu'il s'agisse de symptômes nouveaux, qui s'aggravent ou reviennent. Si vous n'arrivez pas à joindre votre médecin, obtenez une aide médicale dans les plus brefs délais. Montrez-leur cette carte!

Affections auto-immunes

Purpura thrombocytopénique d'origine immunitaire (PTI)

- > Des petites taches de couleur rouge, rose ou violette, disséminées sur la peau
- > Tendance aux ecchymoses
- > Saignement après une coupure plus difficile à arrêter qu'en temps normal
- > Règles plus abondantes, plus longues et plus fréquentes que la normale
- > Saignements entre vos périodes de menstruation
- > Saignement des gencives ou du nez se produisant pour la première fois ou prenant plus de temps pour s'arrêter que d'habitude
- > Trouble hémorragique
- > Toux avec expectoration de sang (peut aussi être un signe de problèmes rénaux)

Problèmes rénaux

- > Sang dans l'urine qui peut être rouge ou couleur thé
- > Jambes ou pieds gonflés

Des problèmes de la glande thyroïde (hypo/hyperthyroïdie)

- > Transpiration excessive
- > Perte ou prise de poids inexplicquée
- > Gonflement des yeux
- > Nervosité
- > Fréquence cardiaque rapide
- > Sensation de froid
- > Une fatigue accentuée
- > L'apparition d'une constipation

Infections graves

- > *Fièvre et/ou frissons et/ou autres réactions fébriles*
- > *Gonflement des ganglions lymphatiques*
- > *Essoufflement, toux, respiration sifflante, douleur dans la poitrine ou oppression, et toux avec expectoration de sang*

Les effets indésirables peuvent se manifester longtemps après la fin de votre cycle de traitement avec LEMTRADA[®].

Il est très important de continuer à effectuer vos tests mensuels (même si vous vous sentez bien).



Vous devez également rester attentif/ve aux signes et aux symptômes



Faites-le pendant 4 ans après votre dernier cycle de traitement avec LEMTRADA[®]



Une détection et un diagnostic précoces sont la meilleure façon d'obtenir une amélioration