

De neuroloog die me **LEMTRADA®** heeft voorgeschreven, kan op het onderstaande telefoonnummer worden bereikt. Ook andere artsen of medisch zorgverleners die bij mijn behandeling betrokken zijn, kunnen hier worden vermeld.

Als er medische onderzoeken worden uitgevoerd, wordt u verzocht kopieën van alle medische dossiers, inclusief alle onderzoeks- en/of behandelingsresultaten, aan de hieronder vermelde arts(en) te verstrekken.

Naam van de patiënt: \_\_\_\_\_

Handtekening van de patiënt: \_\_\_\_\_

		MS-verpleegkundige
		Huisarts
		Neuroloog
Telefoonnummer	Naam	

## Patiëntenkaart

**LEMTRADA®**  
olemtuzumab<sup>12mg</sup>

RMA gewijzigde versie 09/2018

**Draag deze kaart altijd bij u en toon ze aan iedereen die u in urgente hulp verleent en aan medische zorgverleners om hen te informeren over uw behandeling met LEMTRADA®**

Behandeling met **LEMTRADA®** kan een verhoogd risico met zich meebrengen op:

**Auto-immuunziektes zoals:**

- < Een bloedingsziekte met de naam Immuuu Trombocytopenische Purpura (ITP)
- < Zeldzame nieraandoeningen zoals anti-glomerulair basaal membraan (anti-GBM) -ziekte

< Schilddierproblemen (hypo-/hyperthyroïdie)

**Ernstige Infecties**

**Artsen:** Zie de samenvatting van de productkenmerken (SPK) voor meer informatie.

 SANOFLI GENZYME

## Belangrijke bijwerkingen waar u op dient te letten

**Bel onmiddellijk uw neuroloog om de volgende symptomen te melden, ongeacht of het nieuwe, erger wordende of terugkerende symptomen zijn. Als u uw eigen arts niet kan bereiken, moet u onmiddellijk medische hulp zoeken. Toon hen deze kaart!**

### Auto-immuunaandoeningen

#### Immuun Trombocytopenische Purpura (ITP)

- > Kleine verspreide vlekjes op uw huid die rood, roze of paars zijn
- > Neiging tot bloeduitstortingen/ blauwe plekken
- > Bloeding bij een snijwonde die moeilijker dan normaal te stoppen is
- > Zwaardere, langere of meer frequente menstruatieperioden dan normaal
- > Bloedingen tussen menstruatieperioden in
- > Plotselinge tandvlees- of neusbloedingen, of als het langer duurt dan normaal om deze te stoppen
- > Bloedstollingsafwijking
- > Ophoesten van bloed (kan ook een teken zijn van nierproblemen)

#### Nierproblemen

- > Bloed in de urine welke rood of theekleurig kan zijn
- > Zwelling van uw benen of voeten

#### Schildklierproblemen (hypo-/hyperthyroïdie)

- > Overmatig transpireren
- > Verlies/toename van gewicht zonder duidelijke oorzaak
- > Opgezwollen ogen
- > Zenuwachtigheid
- > Snelle hartslag
- > Het koud hebben
- > Opvallende vermoeidheid
- > Plotselinge verstopping

#### Ernstige Infecties

- > **Koorts en/of koude rillingen en/of andere koortsreacties**
- > **Opgezette lymfeklieren**
- > **Kortademigheid, hoesten, piepende ademhaling, pijn op de borst of benauwdheid en bloed ophoesten**

Bijwerkingen kunnen optreden lang nadat u een behandelingskuur met LEMTRADA<sup>®</sup> heeft ondergaan .

**Het is erg belangrijk dat u blijft doorgaan met de maandelijkse onderzoeken (ook al voelt u zich goed).**



Ook dient u alert te blijven op het optreden van klachten en symptomen



Blijf hiermee doorgaan gedurende 4 jaar na uw laatste behandelingskuur met LEMTRADA<sup>®</sup>



Vroegtijdige opsporing en diagnosestelling geven u de meeste kans op verbetering en/of herstel