

Pour tirer un bénéfice maximal des effets du médicament Nplate® sur votre santé, en assurant son bon usage et en limiter ses effets indésirables il existe certaines mesures/précautions à prendre qui sont expliquées dans ce matériel. (RMA version 06/2018)

TAPIS DE PRÉPARATION DE NPLATE®

Vous devez être formé(e) par votre professionnel de la santé avant de pouvoir vous auto-injecter Nplate®.

AVANT DE COMMENCER

- Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- Vous devez fixer un calendrier de traitement régulier, y compris lors de vos déplacements.
- Vérifiez que vous avez toutes les fournitures dont vous avez besoin (reportez-vous aux images ci-dessous).
- Vérifiez la date de péremption sur tous les flacons.
- Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption ou si les flacons sont restés à température ambiante pendant plus de 30 jours.
- Lavez-vous les mains au savon.
- Utilisez une compresse alcoolisée pour nettoyer la surface sur laquelle vous allez préparer le produit.

REMARQUE :

Veuillez utiliser ce tapis avec le *Guide étape par étape* et/ou la *Notice* et le *DVD d'auto-injection* pour préparer votre injection de Nplate®. Vous devrez peut-être utiliser plusieurs flacons de Nplate® pour administrer la dose totale exacte. Si votre médecin vous a indiqué que vous devez utiliser plusieurs injections de Nplate®, suivez les étapes définies dans le *Guide étape par étape* pour obtenir la dose de produit qui vous a été prescrite en utilisant un (des) nouveau(x) kit(s) d'auto-administration.

Assurez-vous que vous avez tout le matériel suivant avant de commencer

A Flacon de poudre (1)



B1 Piston (1)



B2 Seringue préremplie d'eau stérile (1)



C Seringue jetable de 1 ml avec Luer-lock



D Aiguille sécurisée : 27 G, 13 mm (1)



E Adaptateur de flacon (1)



F Compresse alcoolisées (4)



G Conteneur pour matériel médical usagé (1; non fourni)



Conserver les flacons de poudre dans leur emballage à l'abri de la lumière. Ce médicament peut être retiré du réfrigérateur sur une période maximale de 30 jours à température ambiante (jusqu'à 25 °C). Votre professionnel de la santé pourra vous recommander une autre aiguille pour l'injection.

REMARQUE : ces images sont fournies à titre indicatif uniquement.

VOTRE ESPACE DE PRÉPARATION