

Carte d'information destinée aux patients

Cette carte d'information destinée aux patients contient des informations de sécurité importantes dont vous devez avoir connaissance avant et pendant le traitement par denosumab (Prolia®).

Votre médecin vous a prescrit du denosumab (Prolia®), qui est utilisé dans le traitement de l'ostéoporose et de la perte osseuse. Prolia® rend les os plus solides et diminue le risque de fracture.

Un effet indésirable appelé ostéonécrose de la mâchoire (ONM) (altération des os de la mâchoire) a rarement été rapporté (il peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000) chez les patients recevant Prolia® dans le traitement de l'ostéoporose. L'ONM peut aussi apparaître après l'arrêt du traitement.

Il est important d'essayer de prévenir l'apparition de l'ONM car c'est une affection qui peut être douloureuse et difficile à traiter. Afin de réduire le risque de développer une ONM, voici quelques précautions à prendre.

Avant de recevoir le traitement :

Prévenez votre médecin ou votre infirmier (professionnel de santé) de toutes affections au niveau de votre bouche ou de vos dents.

Votre médecin peut vous demander d'effectuer un examen dentaire si :

- Vous avez déjà été traité(e) par un autre médicament de la classe des biphosphonates
- Vous prenez des médicaments appelés des corticostéroïdes (comme prednisolone ou dexaméthasone)
- Vous fumez
- Vous avez un cancer
- Vous n'avez pas eu de bilans dentaires depuis longtemps
- Vous présentez des affections au niveau de votre bouche ou de vos dents

Pendant le traitement :

- Vous devez maintenir une bonne hygiène buccale et faire des bilans dentaires réguliers. Si vous portez des prothèses dentaires, vous devez vous assurer qu'elles sont bien ajustées.
- Si vous êtes en cours de traitement dentaire ou si vous avez prévu une intervention de chirurgie dentaire (par exemple, une extraction dentaire), informez votre médecin de votre traitement dentaire et votre dentiste de votre traitement par Prolia®.
- Contactez immédiatement votre médecin et votre dentiste si vous ressentez n'importe quel problème au niveau de votre bouche ou de vos dents, comme un déchaussement, des douleurs ou un gonflement, un ulcère non-cicatrisé ou un écoulement pendant le traitement par Prolia®, car cela pourrait être le signe d'une ONM.

Lisez attentivement la notice avant d'utiliser le médicament Prolia®.