

Informatiekaart voor patiënten

Deze informatiekaart voor patiënten bevat belangrijke veiligheidsinformatie waar u zich van bewust moet zijn voor en tijdens uw behandeling met denosumab (Prolia®).

Uw arts heeft u aanbevolen denosumab (Prolia®) te gebruiken om osteoporose en botverlies te behandelen. Een behandeling met Prolia® maakt het bot sterker zodat het minder snel zal breken.

Een bijwerking genoemd osteonecrose van de kaak (ONJ, botbeschadiging in de kaak) is zelden gemeld (kan bij maximaal 1 op de 1.000 mensen voorkomen) bij patiënten die denosumab (Prolia®) toegediend kregen voor osteoporose. ONJ kan ook optreden na het stoppen van de behandeling.

Het is belangrijk om het ontwikkelen van ONJ waar mogelijk te voorkomen, omdat het een pijnlijke aandoening is die moeilijk te behandelen kan zijn. Om het risico op ONJ te verminderen zijn er enkele voorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen.

Voordat u de behandeling krijgt:

Vertel uw arts / verpleegkundige (zorgverlener) indien u problemen heeft met uw mond of gebit.

Uw arts kan u vragen eerst een tandheelkundig onderzoek te laten doen als u:

- eerder werd behandeld met bisfosfonaten
- medicijnen genaamd corticosteroiden gebruikt (zoals prednisolon of dexamethason)
- een roker bent
- kanker heeft
- langere tijd geen tandheelkundige check-up heeft gehad
- problemen heeft met uw mond of tanden

Tijdens de behandeling:

- moet u ervoor zorgen dat u een goede mondhygiëne behoudt en regelmatig tandheelkundige controles ontvangt. Als u een kunstgebit draagt moet u ervoor zorgen dat deze goed past.
- Als u een tandheelkundige behandeling of een tandheelkundige operatie dient te ondergaan (bijv. het trekken van een tand of kies), informeer uw arts dan over uw tandheelkundige behandeling en vertel uw tandarts dat u behandeld wordt met denosumab (Prolia®).
- Raadpleeg onmiddellijk uw arts en tandarts als u problemen krijgt met uw mond of gebit zoals loszittende kiezen of tanden, pijn of zwelling, het niet genezen van zweren of etter afscheiding, omdat dit tekenen kunnen zijn van ONJ.

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens het geneesmiddel Prolia® te gebruiken.