

RMA geänderte Version 04/2016



Trobalt™
retigabine



Dieses Arzneimittel unterliegt einer
zusätzlichen Überwachung.

PATIENTENKARTE

**Lesen Sie die Packungsbeilage sorgfältig durch,
bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels
-TROBALT- beginnen.**

Achten Sie auf schwerwiegende Symptome!



→ Informieren Sie sofort Ihren Arzt, wenn Sie eines dieser Symptome bemerken.

- **Augenerkrankungen und Verfärbungen** von Teilen der Augen, Haut, Lippen und/oder Nägel, oder Änderungen des Sehvermögens: ***Eine umfassende Augenuntersuchung sollte vor Behandlung mit Trobalt + alle 6 Monate.***
- **Gedanken an Selbstschädigung oder Selbstmord.**

- **Probleme beim Wasserlassen** : Schmerzen/ Schwierigkeiten beim Wasserlassen, Schwierigkeiten, mit der Blasenentleerung zu beginnen oder Unfähigkeit, Wasser zu lassen.
- **Herzrhythmusstörungen:** ungewöhnliche Puls (z.B.: zu schnell oder zu langsam). Besonders, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, wenn Sie bereits über Herzkrankheit, wenn Sie einen zu niedrigen Blutspiegel von Kalium oder Magnesium, wenn Sie 65 Jahre oder älter sind.
Sie müssen möglicherweise zusätzliche Herzkontrollen.

- **Probleme mit der psychischen Gesundheit:** Verwirrtheit, psychotische Störungen (schwere psychiatrische Erkrankungen), Halluzinationen (Sehen oder Hören von Dingen, die nicht da sind).

Achtung !

- **Seien Sie vorsichtig mit Alkohol während Sie Trobalt einnehmen:** kann das bei Ihnen zu verschwommenem Sehen führen.
- **Schwangerschaft und Stillzeit:** Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie

vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden → **Fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt um Rat.**

- **Wenn Sie eine Urin- oder Blutentnahme unterzogen sind:** Trobalt kann die Ergebnisse einiger Untersuchungen beeinflussen. Wenn bei Ihnen eine Untersuchung von Blut oder Urin erforderlich ist → **Informieren Sie, dass Sie Trobalt einnehmen.**

Halten Sie sich an die Dosierung, die Ihnen Ihr Arzt verschreiben hat um die Verwirrtheit, psychotische Störungen und Halluzinationen zu verringern.

ARZNEIMITTELSHEMA von

.....

(Name) (vom Arzt auszufüllen)

Woche	Packung	Höchstdosis /Tag	Anzahl der Tabletten / Tag
1			
2			
3			



Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, dass Sie TROBALT einnehmen. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie auch andere Arzneimittel einnehmen / anwenden (auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel)

Der Patient muss diese Karte IMMER bei sich tragen (z.B. im Portemonnaie) und sie allen Ärzten/Apothekern oder anderen medizinischen Fachkräften zeigen!