

RMA version modifiée 04/2016



**Trobalt™**  
*retigabine*

▼ Ce médicament fait l'objet d'une surveillance supplémentaire.

**CARTE PATIENT**

**Lisez attentivement la notice avant d'utiliser le médicament Trobalt.**

## Soyez attentif aux symptômes sévères !



→ Prévenez immédiatement votre médecin si vous présentez un de ces symptômes.

- **Troubles oculaires et changement de couleur** de parties de l'œil, de la peau, des lèvres et/ou des ongles, ou modification de votre vision :  
*Un examen complet ophtalmologique est requis avant Trobalt + tous les 6 mois.*
- **Idées d'automutilation ou de suicide.**

- **Problèmes urinaires** : Difficultés et/ou douleurs pour uriner, pour commencer à uriner ou impossibilité totale d'uriner.
- **Troubles du rythme cardiaque** : pouls inhabituel (ex : trop rapide ou trop lent). Surtout si vous utilisez d'autres médicaments, si vous souffrez déjà d'une maladie cardiaque, si vous avez un faible taux sanguin de potassium ou de magnésium, ou si vous avez 65 ans ou plus. ***Vous pourriez avoir besoin de contrôles cardiaques supplémentaires.***

- **Problèmes de santé mentale** : confusion, troubles psychotiques (graves problèmes de santé mentale), hallucinations (voir ou entendre des choses qui n'existent pas).

### **Faites attention !**

- **Prudence avec l'alcool pendant l'utilisation de Trobalt** : votre vue peut devenir trouble.
- **Grossesse et allaitement** : Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez

être enceinte ou planifiez une grossesse :

**→ *Demandez conseil à votre médecin avant de prendre ce médicament.***

- **Si l'on vous fait un prélèvement de sang ou d'urine :** Trobalt peut affecter certains résultats de tests. Si vous passez un examen sanguin ou urinaire :

**→ *Signalez que vous utilisez Trobalt.***

**Respectez la dose prescrite par votre médecin**

pour réduire au minimum le risque d'état confusionnel, d'hallucinations et de troubles psychotiques.

**SCHEMA MEDICAMENTEUX de**

.....

**(nom) (à compléter par le médecin)**

<b>Semaine</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Dose max/jour</b>	<b>Nombre de comprimés/jour</b>
<b>1</b>			
<b>2</b>			
<b>3</b>			



**Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien que vous prenez TROBALT.**

**Si vous utilisez aussi d'autres médicaments (même des médicaments sans ordonnance), prévenez votre médecin ou votre pharmacien.**

**Le patient doit TOUJOURS porter cette fiche sur lui (par ex. dans son portefeuille) et la montrer à tout médecin/pharmacien ou autre prestataire des soins de santé !**

E.R./V.U.: GlaxosmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2-4-6 1300 Wavre Belgium.