

Monitoringschema leverfunctie met Valdoxan® (agomelatine)

Valdoxan 25 mg

- Start aan 25mg ALATU/L
 ASATU/L
- 3 weken ALATU/L
 ASATU/L
- 6 weken ALATU/L
 ASATU/L
- 3 maanden ALATU/L
 ASATU/L
- 6 maanden ALATU/L
 ASATU/L

Voer telkens een controle uit wanneer dit klinisch verantwoord is.

In geval van verhoging van dosering naar **50mg**, de contrôle kalender herstarten.

- Start aan 50mg ALATU/L
 ASATU/L
- 3 weken ALATU/L
 ASATU/L
- 6 weken ALATU/L
 ASATU/L
- 3 maanden ALATU/L
 ASATU/L
- 6 maanden ALATU/L
 ASATU/L

Voer telkens een controle uit wanneer dit klinisch verantwoord is.

Naam van de Patient :

Start datum: _____

Symptomen of tekenen van mogelijke leverbeschadiging*

Serum transaminasen (ALAT, ASAT)

ALAT en/of ASAT > 3 maal de bovenlimiet van de normaalwaarde

ALAT en/of ASAT ≤ 3 maal de bovenlimiet van de normaalwaarde

Normaal

Symptomen of tekenen van mogelijke leverbeschadiging *

Geen symptomen of tekenen van mogelijke leverbeschadiging
Leverfunctietests herhalen binnen 48 uur

ALAT EN/OF ASAT > 3 maal de bovenlimiet van de normaalwaarde

ALAT EN/OF ASAT ≤ 3 maal de bovenlimiet van de normaalwaarde

Stoppen van de behandeling
- De leverfunctie (specifiek transaminasen) dienen te worden gecontroleerd.

Stoppen van de behandeling
- Leverfunctie regelmatig controleren totdat de serum transaminasen teruggekeerd zijn naar het normale niveau.

Doorgaan met de behandeling
- Volg het tijdschema voor de leverfunctie tests

* Zoals donkere urine, bleke stoelgang, gele huid/ogen, pijn in de rechterbovenbuik, aanhoudende en onverklaarbare vermoeidheid.