

Les autorités de santé de l'Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament EXELON[®] dispositif transdermique de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament EXELON[®] dispositif transdermique. (RMA version 06/2013)

EXELON[®] dispositif transdermique (rivastigmine) – Carte-patient

Lisez attentivement la notice avant d'utiliser le médicament EXELON[®] dispositif transdermique.

Objet de ce matériel (RMA ou *Risk Minimisation Activities*) :

Les informations en annexe font partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel d'information à la disposition des professionnels de la santé et des patients/soignants. Ce plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique est une mesure prise afin de garantir une utilisation sûre de EXELON[®] dispositif transdermique. Il doit contenir (selon l'Europe) les éléments importants suivants :









- Retirez le dispositif transdermique précédent avant d'appliquer UN nouveau dispositif.
- Un seul dispositif transdermique par jour.
- Ne découpez pas le dispositif transdermique en morceaux.
- Appuyez fermement sur le dispositif transdermique avec la paume de la main pendant au moins 30 secondes.
- Comment utiliser la carte-patient pour enregistrer l'application du dispositif transdermique et le retrait.

Indication thérapeutique

Exelon est utilisé dans le cadre du traitement de patients adultes atteints de démence légère à modérée due à la maladie d'Alzheimer, une maladie cérébrale progressive qui affecte peu à peu la mémoire, les capacités intellectuelles et le comportement.

MODE D'EMPLOI

- Si vous avez d'autres questions ou besoin d'informations complémentaires, lisez la notice qui accompagne le médicament.
- En cas de doute, prenez contact avec votre médecin ou pharmacien.

 Important à retenir	Comment appliquer le dispositif ?	Où appliquer le dispositif ?
<ul style="list-style-type: none"> • Retirez l'ancien dispositif avant d'appliquer <u>un</u> nouveau dispositif. • <u>Un</u> seul dispositif par jour. • Ne découpez pas le dispositif en morceaux. • Avec la paume de la main, maintenez fermement en place le dispositif pendant au moins 30 secondes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez délicatement l'ancien dispositif avant d'appliquer <u>un</u> nouveau dispositif.  2. N'ouvrez pas le sachet ou ne retirez pas le dispositif tant que vous n'êtes pas sur le point d'appliquer le dispositif. Sortez le nouveau dispositif du sachet.  3. Détachez un côté de la bande de protection du dispositif et ne touchez pas le côté adhésif du dispositif avec les doigts.  4. Collez le dispositif sur le haut ou le bas du dos, le haut du bras ou le thorax et détachez la bande de protection.  5. Avec la paume de la main, maintenez fermement en place le dispositif pendant au moins 30 secondes.  	<p>Retirez l'ancien dispositif avant d'appliquer <u>un</u> nouveau dispositif.</p> <p>Appliquez chaque jour <u>un</u> nouveau dispositif sur <u>une</u> des zones suivantes.</p> <p><u>Vous pouvez utiliser la même zone, mais n'utilisez pas exactement le même endroit.</u></p> <p>N'appliquez pas un nouveau dispositif deux fois en 14 jours au même endroit de la peau.</p> <p>Face avant :</p>  <p>Face arrière :</p>  <p>Vous devez éviter d'appliquer le dispositif sur les seins.</p>

