

Wat moet ik over Lariam weten?

- Lariam is een geneesmiddel dat op recept verkrijgbaar is voor de preventie en behandeling van malaria. Malaria is een mogelijk levensbedreigende infectie. Lariam werkt niet voor alle soorten malaria.
- Zoals uw arts u heeft verteld, moet u Lariam innemen: voordat u op reis gaat, gedurende uw verblijf en na terugkeer uit een malariagebied.
- Gebruik Lariam niet als u psychische problemen heeft of deze ooit heeft gehad, want Lariam kan bij sommige mensen ernstige psychische problemen veroorzaken zoals **zelfmoord, zelfmoordgedachten en gedrag waarbij men zichzelf in gevaar brengt**.

Gebruik Lariam niet als u last heeft of ooit last heeft gehad van:

- depressie, zelfmoord- gedachten
- andere psychische klachten, zoals angststoornis, schizofrenie of psychose (verlies van contact met de werkelijkheid)
- stuipen (epilepsie of toevallen)
- allergie voor kinine, kinidine of Lariam en zijn hulpstoffen
- ernstige leverklachten
- zwartwaterkoorts (een complicatie van malaria die het bloed en de nieren aantast).

Gebruik Lariam niet als u op dit moment een geneesmiddel voor malaria gebruikt met de naam:

- Halofantrine.

Wanneer moet ik mijn arts om advies vragen?

- Als u Lariam gebruikt, is het belangrijk dat u alert bent op mogelijke bijwerkingen. Neuro-psychiatrische problemen kunnen optreden tijdens het gebruik van Lariam.
- Gebruik Lariam niet als u kans loopt om dergelijke bijwerkingen te ontwikkelen (zie '**Gebruik Lariam niet als...**').

Lariam kan bij sommige mensen ernstige psychische problemen veroorzaken. Vertel het direct aan uw arts als u last heeft van één (of meerdere) van onderstaande bijwerkingen tijdens het gebruik van Lariam:

- Zelfmoord-gedachten,
- gedrag waarbij men zichzelf in gevaar brengt,
- ernstige angstgevoelens,
- gevoelens van wantrouwen ten opzichte van anderen,
- dingen zien of horen die er niet zijn,
- depressie,
- rusteloosheid,
- ongewoon gedrag
- gevoel van verwardheid

Contacteer onmiddellijk uw arts.

Het gebruik van Lariam moet onmiddellijk worden stopgezet en vervangen door een ander middel ter preventie van malaria.

Andere bijwerkingen van Lariam kunnen zijn:

Stuipen (epilepsie of toevallen), leverklachten, hartklachten, misselijkheid, overgeven, diarree, buikpijn, duizeligheid of evenwichtsverlies (vertigo), hoofdpijn, slaapproblemen (slaperigheid, niet kunnen slapen, nare dromen).

Hoe gebruikt u Lariam:

- Neem de tabletten eenmaal per week in, altijd op dezelfde dag.
- Neem de 1e dosis Lariam ten minste 10 dagen voor uw vertrek: dit is nodig om er zeker van te zijn dat toediening van Lariam goed wordt verdragen
- Neem de 2e dosis 3 dagen voor vertrek in.
- Tijdens uw verblijf en gedurende 4 weken na terugkomst moet u doorgaan met het innemen van de tabletten.



Lariam® 250mg (mefloquine)

Deze kaart bevat belangrijke informatie voor u over mogelijke psychische bijwerkingen van Lariam.

Lees ook de bijsluiter die u bij dit geneesmiddel ontvangt – daarin staat alle informatie over Lariam.

Draag deze kaart altijd bij u. Laat deze kaart zien aan alle artsen die u raadpleegt.

V. U.: Dr. Chr. Lenaerts – Br.0761 – 10/2013

Wanneer moet ik mijn arts om advies vragen?

- Altijd: als u bijwerkingen vertoont
- Als u niet zeker weet of u een van de klachten heeft die in de lijst staan vermeld in de rubriek: **Gebruik Lariam niet als...**
- Als u denkt dat u mogelijk een van de psychische bijwerkingen heeft die in volgende rubriek vermeld staan: **Lariam kan bij sommige mensen ernstige psychische problemen veroorzaken...**

Ik gebruik malariachemoprophylaxe met Lariam (mefloquine).

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Andere geneesmiddelen/
aandoeningen:

In geval van nood:

Naam arts:

Telefoonnummer:

Stempel arts:

RMA versie 10/2013



Waarschuwingskaart
voor de patiënt

Lariam® 250mg
(mefloquine)

