

Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du médicament STRATTERA® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament STRATTERA® (RMA version modifiée 12/2013)

CHECKLIST DES ACTIONS À PRENDRE AVANT LA PRESCRIPTION ET /OU L'ADMINISTRATION DE STRATTERA®.

Identifiant du Patient Date

CHECK

Un spécialiste (pédiatre, pédopsychiatre, psychiatre, neuropsychiatre) du traitement du TDAH a fait le diagnostic initial de votre patient conformément aux critères DSM-IV ou aux guidelines ICD-10



Une anamnèse médicale complète a été réalisée, y compris:

- Médicaments concomitants:

.....
Note: l'atomoxetine doit être utilisée avec précaution lorsqu'elle est associée à des médicaments antihypertenseurs ou vasopresseurs, ou à des médicaments susceptibles d'augmenter la tension artérielle (ex : le salbutamol)

- Anamnèse familiale:

.....
Note : une anamnèse familiale de mort subite d'origine cardiaque/mort inexpliquée ou d'arythmie maligne est un facteur de risque de conséquences cardiovasculaires.

Comorbidités actuelles ou passées ou symptômes :



Une évaluation de l'état cardiovasculaire de base du patient a été faite, incluant les mesures de la tension artérielle et du rythme cardiaque (pour les enfants: il est recommandé de reporter ces mesures sur une courbe de percentile ou –si non disponible, sur le fichier en annexe).



Un examen physique a été réalisé

Remarques



Informations complémentaires au verso >

CHECK

L'évaluation montre l'absence de troubles cardiovasculaires ou cérébro-vasculaires graves.

Les troubles cardiovasculaires graves peuvent inclure:

- Hypertension grave
- Insuffisance cardiaque ou pathologie artérielle occlusive
- Angine de poitrine
- Maladie cardiaque congénitale hémodynamiquement significative, cardiomyopathies, infarctus du myocarde, arythmies et canalopathies (troubles causés par une dysfonction des canaux ioniques) pouvant menacer le pronostic vital.

Les troubles cérébrovasculaires graves peuvent inclure :

- Anévrisme cérébral ou accident vasculaire cérébral.

UN SEUL CHOIX POSSIBLE

Les résultats préliminaires de l'anamnèse du patient et de l'examen physique

ne suggèrent pas de pathologie cardiovasculaire ou cérébro vasculaire

ou

Les résultats préliminaires de l'anamnèse du patient et de l'examen physique suggèrent

la présence d'une maladie cardiovasculaire ou cérébro vasculaire, et un spécialiste en cardiologie autorise l'initiation du traitement avec le Stratterra® sous surveillance étroite.

Il y a lieu de s'assurer que chaque case a été cochée avant de démarrer le traitement du patient.